


1. Scegli quale, fra le risposte date, è quella corretta:

1) Il triangolo ABC è tale che A (-3; -2), B (1; 4) e il baricentro è G (-1; -3). Il terzo vertice ha coordinate:

(A) (2; -8) (B) (-1; -11) (C) (0; 0) (D) (-2; 7)

2) Se la retta $y = mx + q$ ha il grafico riportato a lato, quale delle seguenti affermazioni è vera?

(A) $4m + 3q = 0$ (B) $m < q$
 (C) $2m = 3q$ (D) $m = q$



3) Se la retta di coefficiente angolare $3/5$ passa per il punto (3; 1), allora deve passare anche per il punto:

(A) (0; 4) (B) (1; 0) (C) (2; -1) (D) (-2; -2)

4) La retta $y - 1 = 5(x - 1)$ passa per (0; n). Qual è il valore di n?

(A) 0 (B) -4 (C) -1 (D) -2

5) Qual è il coefficiente angolare della retta che passa per l'origine e per il punto (-3; 2)?

(A) $-0,6$ (B) -1,5 (C) 1,5 (D) -0,75

6) La retta $y = x$, la sua simmetrica rispetto all'asse y e una qualsiasi parallela rispetto all'asse x formano un triangolo:

(A) rettangolo scaleno (B) equilatero (C) nessuno dei precedenti (D) rettangolo isoscele

7) La retta passante per il punto A (3; 1) che ha per coefficiente angolare $1/2$ ha equazione:

(A) $x + 2y - 1 = 0$ (B) $x - 2y + 5 = 0$ (C) $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ (D) $x - 2y - 1 = 0$

8) Solo una fra le seguenti coppie di rette ha come intersezione il punto A (1; -1)

(A) $\begin{cases} 4x + 1 = 0 \\ 3x - 2y - 5 = 0 \end{cases}$ (B) $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = 4 - 2x \end{cases}$ (C) $\begin{cases} y - x + 2 = 0 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} y + 1 = 0 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$

9) Il coefficiente angolare della retta che passa per i punti A (-1; -7) e B (3; 1) è:

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 2 (C) -2 (D) $\frac{3}{2}$

10) Stabilisci per quale valore di k le rette $y - x + 3 = 0$ e $(k - 1)y + x - 4k = 0$ sono parallele:

(A) nessun valore di k (B) -1 (C) 0 (D) 1

2. Trova il punto C della retta $r: x + 3y - 5 = 0$, che sia equidistante dai due punti A (2; -1) e B (3; 1).

Il punto C ha generiche coordinate $C(x; y)$, perciò mi servono due condizioni per determinarle.

La prima condizione è l'appartenenza alla retta r: sostituendo le coordinate di C nell'equazione della retta ottengo un'identità.

La seconda condizione è l'equidistanza di C dai punti A e B, ovvero: $\overline{AC} \cong \overline{BC}$, che è come dire: $\overline{AC}^2 = \overline{BC}^2$.

Mettendo a sistema le due condizioni:

$$\begin{cases} x + 3y - 5 = 0 \\ (x - 2)^2 + (y + 1)^2 = (x - 3)^2 + (y - 1)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 3y - 5 = 0 \\ x^2 - 4x + 4 + y^2 + 2y + 1 = x^2 - 6x + 9 + y^2 - 2y + 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2x + 4y = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2x - 6y = -10 \\ 2x + 4y = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2y = -5 \\ -2y = -5 \end{cases} \Rightarrow y = \frac{5}{2}$$


$$x + 3 \cdot \frac{5}{2} = 5 \Rightarrow x = -\frac{5}{2}$$

$$C\left(-\frac{5}{2}; \frac{5}{2}\right)$$

3. I punti C (9; 1) e D (4; -2) sono due vertici consecutivi di un parallelogrammo ABCD ed M (3; 0) è il punto d'intersezione delle diagonali. Scrivi le equazioni dei lati del parallelogrammo.

In un parallelogrammo, il punto d'incontro delle diagonali è anche punto medio delle stesse. Perciò posso determinare il punto A della diagonale AC nel seguente modo, conoscendone il punto medio M:

$$\begin{cases} \frac{x_A + x_C}{2} = x_M \\ \frac{y_A + y_C}{2} = y_M \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{x_A + 9}{2} = 3 \\ \frac{y_A + 1}{2} = 0 \end{cases} \Rightarrow A(-3; -1)^1$$



Considerato che le rette sono a due a due parallele, determino prima i coefficienti angolari:

$$m_{\overline{AB}} = m_{\overline{CD}} = \frac{1 + 2}{9 - 4} = \frac{3}{5} \quad m_{\overline{BC}} = m_{\overline{DA}} = \frac{-1 + 2}{-3 - 4} = -\frac{1}{7}$$

Sostituendo le coordinate dei punti nell'equazione $y - y_0 = m(x - x_0)$ e il corrispondente valore del coefficiente angolare, determino le equazioni delle quattro rette:

$$\overline{AB}: y + 1 = \frac{3}{5}(x + 3) \Rightarrow 3x - 5y + 4 = 0$$

$$\overline{CD}: y - 1 = \frac{3}{5}(x - 9) \Rightarrow 3x - 5y - 22 = 0$$

$$\overline{BC}: y - 1 = -\frac{1}{7}(x - 9) \Rightarrow x + 7y - 16 = 0$$

$$\overline{DA}: y + 1 = -\frac{1}{7}(x + 3) \Rightarrow x + 7y + 10 = 0$$

¹ Non è necessario, viste le richieste dell'esercizio, determinare le coordinate del quarto vertice.