1. Al variare del parametro reale k , studia la natura delle coniche del fascio di equazione:

$$x^2 + (k^2 - 1)y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$$

Scrivo l'equazione del fascio in forma canonica:

$$(x^2 - 2x + 1) + (k^2 - 1) \left(y^2 - \frac{4}{k^2 - 1}y + \frac{4}{(k^2 - 1)^2} \right) = -3 + 1 + \frac{4}{k^2 - 1}$$

$$(x - 1)^2 + (k^2 - 1) \left(y - \frac{2}{k^2 - 1} \right)^2 = \frac{-2k^2 + 6}{k^2 - 1}$$

L'equazione data rappresenta una conica:

Se $\frac{-2k^2 + 6}{k^2 - 1} = 0 \Rightarrow k = \pm\sqrt{3}$: l'equazione rappresenta una conica degenera

Se $k^2 - 1 < 0 \Rightarrow -1 < k < 1$: l'equazione rappresenta un'iperbole

In particolare: se $k^2 - 1 = -1 \Rightarrow k = 0$, l'equazione rappresenta un'iperbole equilatera

Se $k^2 - 1 = 0 \Rightarrow k = \pm 1$: l'equazione rappresenta una parabola

Se $k^2 - 1 > 0$, l'equazione rappresenta un'ellisse e, dato che i coefficienti dei termini di secondo grado, sono entrambi positivi, deve essere positivo anche il termine noto, perciò:

$$\begin{cases} k^2 - 1 > 0 \\ \frac{-2k^2 + 6}{k^2 - 1} > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} k < -1 \vee k > 1 \\ -\sqrt{3} < k < -1 \vee 1 < k < \sqrt{3} \end{cases}$$

Se $-\sqrt{3} < k < -1 \vee 1 < k < \sqrt{3}$, l'equazione rappresenta un'ellisse reale

In particolare: se $k^2 - 1 = 1 \Rightarrow k = \pm\sqrt{2}$, l'equazione rappresenta una circonferenza

Se $k = \pm\sqrt{3}$: l'equazione rappresenta un'ellisse degenera

Se $k < -\sqrt{3} \vee k > \sqrt{3}$, l'equazione rappresenta un'ellisse non reale

2. Determina per quale valore di k l'equazione $x^2 - ky^2 - 3x - 2y - 4 = 0$ è rappresentata da due rette.

Perché l'equazione sia rappresentata da due rette, deve trattarsi di una conica degenera:

$$x^2 - 3x + \frac{9}{4} - k \left(y^2 + \frac{2}{k}y + \frac{1}{k^2} \right) = 4 + \frac{9}{4} - \frac{1}{k} \Rightarrow 4 + \frac{9}{4} - \frac{1}{k} = 0 \Rightarrow \frac{1}{k} = \frac{25}{4} \Rightarrow k = \frac{4}{25}$$

La conica risultante è un'iperbole degenera:

$$x^2 - 3x + \frac{9}{4} - \frac{4}{25} \left(y^2 + \frac{25}{2}y + \frac{625}{16} \right) = 4 + \frac{9}{4} - \frac{25}{4} \quad \left(x - \frac{4}{25}y - \frac{5}{2} \right) \left(x + \frac{4}{25}y - \frac{1}{2} \right) = 0$$

3. Scrivi l'equazione del luogo geometrico dei punti P per i quali il rapporto tra le distanze da $A(0, 3)$ e dalla retta di equazione $y = -1$ è uguale a $\sqrt{2}$.

Sia P un punto generico di coordinate $P(x; y)$, pongo il rapporto tra le distanze date uguale a $\sqrt{2}$:

$$\frac{\overline{PA}}{d(P; y = -1)} = \sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{x^2 + (y - 3)^2} = \sqrt{2} |y + 1| \Rightarrow$$

$$x^2 + y^2 - 6y + 9 = 2y^2 + 4y + 2 \Rightarrow x^2 - y^2 - 10y + 7 = 0$$

4. Determina l'equazione cartesiana del luogo descritto dai centri delle iperboli del seguente fascio: $y = \frac{kx-1}{(k+2)x+3}$

Si tratta di un fascio di funzioni omografiche di generico centro: $C\left(-\frac{3}{k+2}; \frac{k}{k+2}\right)$. Perciò, indicate le due coordinate in funzione del parametro, ricavo il parametro in funzione di una delle variabili e determino così l'equazione cartesiana:

$$\begin{cases} x = -\frac{3}{k+2} \\ y = \frac{k}{k+2} \end{cases} \quad \begin{cases} k+2 = -\frac{3}{x} \\ y = \frac{-\frac{3}{x}-2}{-\frac{3}{x}} \end{cases} \quad y = \frac{2x+3}{3} \quad y = \frac{2}{3}x + 1$$

Il luogo è una retta, con l'esclusione di alcuni punti: $x \neq 0$, come si evince dall'equazione che lega x e k . Devo escludere anche il valore del parametro per cui il fascio non rappresenta un'iperbole e, quindi, il corrispondente valore della x :

$$3k + k + 2 \neq 0 \Rightarrow k \neq -\frac{1}{2} \Rightarrow x \neq -\frac{3}{-\frac{1}{2} + 2} \Rightarrow x \neq -2$$

Perciò: $y = \frac{2}{3}x + 1$ con $x \neq 0 \wedge x \neq -2$.

5. Scrivi una rappresentazione analitica della parte di piano colorata:

La parabola ha vertice nel punto $V(0, -2)$ e asse di simmetria coincidente con l'asse y , perciò ha generica equazione $y = ax^2 - 2$. Sostituisco le coordinate del punto $(2, 0)$ e determino il parametro:

$$0 = 4a - 2 \Rightarrow a = \frac{1}{2} \Rightarrow y = \frac{1}{2}x^2 - 2$$

Scelgo l'origine come punto di prova, appartenente all'area interna alla parabola:

$$y \geq \frac{1}{2}x^2 - 2$$

La circonferenza ha centro nell'origine e raggio 1. Ne considero solo la parte esterna, perciò:

$$x^2 + y^2 > 1$$

La retta rappresentata è la bisettrice di primo e terzo quadrante. Il punto $(1, 0)$ appartiene alla regione colorata:

$$y = x \wedge 0 \leq 1 \Rightarrow y \leq x$$

Concludendo:

$$\begin{cases} y \geq \frac{1}{2}x^2 - 2 \\ x^2 + y^2 > 1 \\ y \leq x \end{cases}$$

6. Determina l'area della regione di piano definita dal sistema di disequazioni: $\begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \leq 1 \\ y \geq \frac{4}{3}x + 4 \end{cases}$

La prima equazione rappresenta un'ellisse con i fuochi sull'asse y e semiassi $a = 3$ e $b = 4$. Ne coloro la parte interna.

La seconda equazione rappresenta un semipiano delimitato da una retta e, sostituendo le coordinate dell'origine come punto di prova, la disequazione non è verificata.

La parte di piano da considerare è quella rappresentata a fianco.

Per determinarne l'area, considero un quarto dell'ellisse – ovvero la parte situata nel secondo quadrante – e sottraggo l'area del triangolo rettangolo con vertici nell'origine e nei vertici dell'ellisse, $(-3, 0)$ e $(0, 4)$.

Perciò:

$$\mathcal{A} = \frac{\pi ab}{4} - \frac{1}{2}ab = 3\pi - 6$$